

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)  
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
بهار ۱۳۸۸

## «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

۱. سرفه بیش از ۲ هفته
۲. خلط خونی
۳. کم اشتها و کاهش وزن
۴. بی حالی و ضعف عمومی
۵. خلط (زیاد)
۶. تب و عرق شبانه
۷. درد قفسه سینه و تنگی نفس

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت رایگان انجام می شود.

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)  
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
بهار ۱۳۸۸

## «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

۲۱. سرفه بیش از ۲ هفته
۲۲. خلط خونی
۲۳. کم اشتها و کاهش وزن
۲۴. بی حالی و ضعف عمومی
۵. خلط (زیاد)
۶. تب و عرق شبانه
۷. درد قفسه سینه و تنگی نفس

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت رایگان انجام می شود.

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)      مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
بهار ۱۳۸۸      واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)      مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
بهار ۱۳۸۸      واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)      مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
بهار ۱۳۸۸      واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

## کنترل بیماری سل نیاز به عزم ملی دارد

شهروند گرامی، آیا می دانید که:

- \* خطرناک ترین نوع بیماری سل، سل ریوی خلط دار می باشد.
- \* سالانه نزدیک به ۱۶ هزار مورد سل در ایران اتفاق می افتد.
- \* هر ۱۵ ثانیه یک نفر در جهان به علت بیماری سل فوت می شود.
- \* بیماری سل می تواند هر عضوی از بدن را گرفتار نماید.
- \* هر بیمار سلی در طی سال ۱۵-۱۰ نفر را آلوده می کند.
- \* بیماری سل از طریق غذا و لباس منتقل نمی شود.
- \* رعایت بهداشت فردی برای کنترل بیماری سل بسیار با اهمیت است.
- \* بیماری سل یکی از علل مهم نارسایی رشد کودکان است.
- \* بیماری سل به راحتی طی یک دوره ۶ ماهه قابل درمان است.

انتشارات کمیته علمی - اجرایی آموزش بهداشت (۱۳۸۸)      مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین  
بهار ۱۳۸۸      واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

### «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

- ۵. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۶. خلط (زیاد)
- ۷. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۸. بی حالی و ضعف عمومی
- ۹. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۰. خلط خونی
- ۱۱. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۱۲. بی حالی و ضعف عمومی

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت **رایگان** انجام می شود.

### «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

- ۵. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۶. خلط (زیاد)
- ۷. درد قفسه سینه و تنگی نفس
- ۸. بی حالی و ضعف عمومی
- ۹. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۰. خلط خونی
- ۱۱. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۱۲. بی حالی و ضعف عمومی

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت **رایگان** انجام می شود.

### «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

- ۱۳. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۴. خلط (زیاد)
- ۱۵. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۱۶. بی حالی و ضعف عمومی
- ۱۷. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۸. خلط خونی
- ۱۹. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۲۰. بی حالی و ضعف عمومی

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت **رایگان** انجام می شود.

### «بیماری سل را جدی بگیریم»

در صورت مشاهده علائم زیر در خود یا اطرافیان به بیماری سل شک کنیم:

- ۱۷. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۸. خلط (زیاد)
- ۱۹. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۲۰. بی حالی و ضعف عمومی
- ۱۷. سرفه بیش از ۲ هفته
- ۱۸. خلط خونی
- ۱۹. کم اشتهایی و کاهش وزن
- ۲۰. بی حالی و ضعف عمومی

بهترین، ارزان ترین و مهم ترین روش تشخیص سل ریوی  
انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه خلط بیمار می باشد.

کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سل در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

به صورت **رایگان** انجام می شود.

